


# ჩემი 5 მომენტი ხელის ჰიგიენისთვის

## ფოკუსირება პერიფერიული ვენის კათეტერის მქონე პაციენტის მოვლაზე

**დაუყოვნებლივ** – კათეტერსა და ინტრავენური მედიკამენტების შეყვანის სისტემასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მანიპულაციის დაწყებამდე, როგორიცაა:

- 2ა. კათეტერის ჩადგმა ან ამოღება (სუფთა, არასტერილურ ხელთათმანების ჩაცმამდე), სახვევის შეცვლა, სისხლის აღება ან ამ პროცედურებისთვის შესაბამისი აღჭურვილობის მომზადებამდე
- 2ბ. ადმინისტრირების ადგილის გახსნა და საინფუზიო სისტემის მიერთება
- 2გ. მედიკამენტების მომზადება კათეტერში შეყვანისთვის



**დაუყოვნებლივ** -ნებისმიერი დავალების შემდეგ, რომელიც შეიძლება ითვალისწინებდეს ბიოლოგიური სითხის ექსპოზიციას, როგორიცაა:

- 3ა. კათეტერის ჩასმა ან მოხსნა
- 3ბ. სისხლის აღება

### ძირითადი დამატებითი მოსაზრებები პერიფერიული ინტრავენური კათეტერებისთვის

- 1. **ჩვენება:** დარწმუნდით, რომ პერიფერიული ვენის კათეტერი მოთხოვნილია. ამოიღეთ კათეტერი, როდესაც ის აღარ არის საჭირო/არ არის კლინიკური ჩვენება.
- 2. **ჩადგმა/მოვლა/ამოღება**
  - 2.1 კათეტერის ჩადგმამდე მოამზადეთ კანი ანტისეპტიკით (70% სპირტი, იოდის ნაყენი, იოდოფორი ან ალკოჰოლზე დაფუძნებული 2% ქლორჰექსიდილის გლუკონატი).
  - 2.2 ატარეთ სუფთა, არასტერილური ხელთათმანები და გამოიყენეთ ასეპტიკური პროცედურა (შეხების გარეშე ტექნიკით) კათეტერის ჩასმის, ამოღებისა და სისხლის აღების მიზნით.
  - 2.3 შეცვალეთ ნებისმიერი მშრალი დოლბანდის ტიპის სახვევი ყოველ 2 დღეში.
  - 2.4 გაითვალისწინეთ კათეტერის დაგეგმილი შეცვლა ყოველ 96 საათში.
  - 2.5 შეცვალეთ მილაკი, რომელიც გამოიყენება სისხლის, სისხლის პროდუქტების, ქიმიოთერაპიის და ცხიმოვანი ემულსიების შესაყვანად ინფუზიის დაწყებიდან 24 საათის განმავლობაში. დაგეგმეთ ყველა სხვა მილის შეცვლა ყოველ 96 საათში.
- 3. **მონიტორინგი:** ჩაწერეთ კათეტერის ჩადგმის ამოღების და სახვევის შეცვლის თარიღი და დრო, ასევე კათეტერის ადგილის მდგომარეობა (ვიზუალური შეფასებით) ყოველდღე.



**დაიცავი ხელის ჰიგიენა  
გადაარჩინე სიცოცხლე!**

**სუფთა გარემო განაპირობებს  
უსაფრთხო მოვლას!  
2005-2022**